

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

10

化膿性皮膚疾患用薬

第2類医薬品

皮膚の化膿症状に

# クロマイセチン<sup>®</sup>軟膏2%A

## クロマイセチン軟膏2%Aの特徴

1. 抗生物質クロラムフェニコールが化膿した患部を治します。
2. 伸びがよく、ベタつかない肌なじみのよいクリーム剤です。

## ⚠ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないで下さい。  
本剤又は本剤の成分、抗生物質によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないで下さい。  
目や目の周囲
3. 長期連用しないで下さい。



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (3) 患部が広範囲の人
  - (4) 湿潤やただれのひどい人
  - (5) 深い傷やひどいやけどの人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、水疱

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

## ■ 効能・効果

化膿性皮膚疾患（とびひ、めんちょう、毛のう炎）

## ■ 使用法

1日1～数回、適量を患部に塗布するか、ガーゼなどにのぼして貼付して下さい。

〈使用法に関連する注意〉

- (1) 使用法を厳守して下さい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3) 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (4) 外用にのみ使用して下さい。

## ■ 成分・分量

本品は白色のクリーム剤で、100g中に次の成分を含有しています。

成分	分量	はたらき
クロラムフェニコール	2g(力価)	細菌の発育や増殖をおさえます。(抗生物質)

添加物：セタノール、流動パラフィン、ラウリル硫酸Na、パラベン

## ■ 保管及び取扱い上の注意

1. 凍結をさせて、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
4. 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電 話 0120-337-336

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

10 ㊞登録商標

 製造販売元  
**第一三共ヘルスケア株式会社**  
東京都中央区日本橋3-14-10