



肩こり・腰痛に

鎮痛消炎プラスター

KOTTA TOKORO NO KANBŪ NI KIKU,
ROIHI-TSUBOKŌ COOL.
Gokatei ni ohitotsu dōzo.

第3類医薬品

つらい痛みにも **スーッと効く**

ロイヒつぼ膏™

COOL
クール

小型丸形で貼りやすい

実物大

直径2.8cm

KATAKORI YŌTSŪ KANSETSŪTSŪ DABOKU
KINNIKŪTSŪ KINNIKUHIRŌ

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ぎけくわ

販売名

ロイヒつぼ膏クール

第3類医薬品

品番 RC156

特長

●ロイヒつぼ膏TMクールは、有効成分のサリチル酸メチル、*l*-メントールなどの鎮痛消炎成分が肩こり、腰・関節・筋肉のつらい痛みにすぐれた効果をあらわします。●ひとりで簡単に貼れる、目立たない小型の丸形プラスターです。●伸縮性があるので、肌によくフィットします。

△使用上の注意

⊗【してはいけないこと】(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください。

①目の周囲、粘膜等。②湿疹、かぶれ、キズぐち。



【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

①本人又は家族がアレルギー体質の人。

②薬や化粧品等によりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、ただちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、色素沈着、皮膚はく離等

3. 5～6日間使用しても症状の改善がみられない場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【貼り方の参考例】

下図を参考に、指で押してみても痛みを感じる場所、こりがあるところを中心に貼ってください。



例1 肩こり



例2 肩こり



例3 肩こり・腰痛



例4 腰痛

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
TEL0120-149931 NB17D02

効能・効果

肩こり、腰痛、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、捻挫、骨折痛

用法・用量

1 日数回患部に貼付する。

◆用法・用量に関連する注意

- ① 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- ② 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側に1cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が発現しないことを確かめてから使用してください。
- ③ 皮膚の弱い人は、同じところには続けて貼らないでください。
- ④ 汗などをよく拭きとり、患部をきれいにしてからお貼りください。
- ⑤ 外用にのみ使用し、内服しないでください。

成分・分量

膏体100g中 サリチル酸メチル・・・6.7g
l-メントール・・・6.7g
dl-カンフル・・・3.3g

添加物として、スチレン・イソブレン・スチレン共重合体、テルペン樹脂、水素添加ロジン、グリセリンエステル、流動パラフィン、BHT、香料、その他1成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- ① 小児の手のとどかない所に保管してください。
- ② 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- ③ 誤用をさけ、品質を保持するため、開封後は、チャックを合わせ閉じて、保管してください。
- ④ 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

<包装> 直径2.8cm

本品についてのお問い合わせは、
お買い求めの販売店、又は下記の
「お客様相談室」にお願いいたします。

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3
<http://www.nichiban.co.jp/>
お客様相談室 TEL0120-377218
受付時間：9:00～12:00、
13:00～17:00(土、日、祝日を除く)

MADE IN JAPAN 日本製 TMは商標です。