

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要ときに読めるよう保管してください。

メンソレータム® やわらか 素肌クリーム




販売名：
メンソレータム®やわらか素肌クリームU

有効成分 **尿素20%** **ビタミンE誘導体**配合 **第3類医薬品** **皮フ軟化薬**


コチコチかかとかすらずなめらか ガサガサ手荒れしっかりうるおす

長年のうちにかたくなったかかとお手入れ、大変です。「かたく荒れたかか」とは、皮フの衰えと摩擦・伸縮のくりかえしで肌の柔軟性が落ち、角質層の水分を失ったうるおい不足の肌質が原因です。メンソレータム®やわらか素肌クリームUは、尿素20%とビタミンE誘導体を配合し、かたく荒れた皮フにしみこんで、内側からしっかりと多量の水分をつかまえて放さないから、コチコチだったかかとも、ぬるだけで肌をいためず、すっきりなめらかなもとのやわらかさにもどしていきます。もちろんガサガサになった手荒れや、黒ずんだひじ・ひざの荒れにもすぐれた効果をあらわします。

空気の乾燥・冷え、水仕事、老化による保水力・血行不良・柔軟性の低下が原因です。



かたく、ゴワついた肌



すべすべのなめらか肌

イメージ図

●水分 ●尿素
▲ビタミンE誘導体

有効成分がじっくり浸透して、健康なやわらか素肌をとりもどします。

3つの有効成分

グリチルリチン酸 —アンモニウム

炎症を、修復しながら鎮めます。

尿素

体の中の水分を皮フ表面の角質層に効率的にとりこむ一方で、クリームの中の水分も吸収して皮フの保水量を増加させます。

トコフェロール 酢酸エステル (ビタミンE誘導体)

血行を促進、症状の改善を促します。

ワセリン (油性基剤)

薄い保護膜を形成します。



こんな方に

ガサガサ 手荒れ

黒ずんだ
ひざ・ひじの
ザラザラ



コチコチ
かかとの
角質

スクワラン (油性基剤)

人の皮脂にも含まれています。

夜のお手入れもおすすめ



夜10時から午前2時くらいは
お肌の新陳代謝がよくなる
といわれています。
お風呂上がりや、寝る前にも
メンソレータム®やわらか素肌クリームU
でのお手入れをおすすめします。

もとのやわらか素肌に

美しく健康な皮フは、見た目にうるおいやハリがあって生き生きとしているだけでなく、角質層が水分と油分をバランスよくためこみ、キメが整っています。また、古くなった角質をはがし、新しい角質を生み出す新陳代謝が活発に行われていますので、弾力のある、やわらかくなめらかな肌ざわりをしています。



⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目や目のまわり、粘膜等。
- (2) 引っかき傷等のきずぐち、亀裂(ひび割れ)部位。
- (3) かさぶたの様に皮フがはがれているところ。
- (4) 炎症部位(ただれ・赤くはれているところ)。

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(いたみ、熱感、びりびり感)、かさぶたの様に皮フがはがれる状態

3. 2週間位使用しても症状がよくなる場合使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

効能・効果

手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌

用法・用量

1 日数回、適量を患部にすりこんでください。

●用法・用量に関連する注意

- (1) 用法・用量を守ってください。
- (2) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
- (4) 化粧品ではないので、効能・効果で定められた患部にのみ使用し、基礎化粧品等の目的で顔面には使用しないでください。

成分(1g中)

- 尿素 200mg
- トコフェロール酢酸エステル(ビタミン E 誘導体) 5mg
- グリチルリチン酸アーンモニウム 5mg

添加物として、*l*-メントール、流動パラフィン、1,3-ブチレングリコール、セタノール、スクワラン、ワセリン、カルボキシビニルポリマー、2-エチルヘキサミン酸セチル、ペクチン、乳酸、トリエタノールアミン、ステアリン酸グリセリン、セトマクロゴール、パラベン、BHT、エドト酸Na、グリシンを含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 本剤のついた手で目や粘膜に触れないでください。
- (2) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。
- (3) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。

お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京：03-5442-6020 大阪：06-6758-1230

受付時間 9：00～18：00(土、日、祝日を除く)

ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1