

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## しみ、そばかす、日やけによる色素沈着

第3類医薬品 ビタミンC主薬製剤

# ビタミンC錠 2000

### 製品の特徴

ビタミンC(アスコルビン酸)は生理的に重要な働きをするビタミンの一つですが、他のビタミンと同じように体内でつくることができないので、食品または医薬品から積極的に摂取する必要があります。

ビタミンC錠2000は、アスコルビン酸として2000mgを含むビタミンC主薬製剤です。

### ⚠ 使用上の注意

#### 相談すること



1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師にご相談ください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	悪心・嘔吐

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

2. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

下痢

### 効能又は効果

○ 次の諸症状の緩和:しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

○ 次の場合の出血予防:歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、歯科医師又は薬剤師にご相談ください。」

○ 次の場合のビタミンCの補給:肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

### 用法及び用量

次の量を、1日2回服用する場合は朝夕、1日3回服用する場合は朝昼晩、口の中でとくすか、又はかみくだいて服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
大人(15歳以上)	4 錠	2回(朝夕) 3回(朝昼晩)
11~14歳	2 1/2錠	
7~10歳	2 錠	
5~6歳	1 錠	
乳幼児(5歳未満)	服用しないこと	

### <用法及び用量に関連する注意>

- 定められた用法及び用量を守ってください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

### 成分及び分量

12錠中

成 分	含 量
アスコルビン酸	1000mg
L-アスコルビン酸ナトリウム (アスコルビン酸として)	1124.7mg 1000mg

添加物としてビタミンB<sub>2</sub>、白糖、部分アルファ化デンプン、乳糖水和物、サッカリンナトリウム水和物、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mgを含有する。

### <成分及び分量に関連する注意>

本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。尿及び大便の検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師にお知らせください。

### 保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

### 問い合わせ先

- 本製品の購入店
- 佐藤薬品工業株式会社 医薬情報室  
TEL 0744-28-0021  
受付時間 9:00~16:30(土・日・祝日を除く)

製造販売元



佐藤薬品工業株式会社

奈良県橿原市観音寺町9番地の2